

AMAUTA WAYRA Boro

Fertilizante foliar soluble con alto contenido de Boro (B), formulado para favorecer la floración, el cuajado y el desarrollo uniforme de frutos, asegurando una correcta fertilidad y calidad en la cosecha.

COMPOSICIÓN

N Total



B



BENEFICIOS

- Favorece la floración y el cuajado de frutos.
- Previene y corrige deficiencias de Boro (B).
- Optimiza el transporte de azúcares y la síntesis de carbohidratos.

PRESENTACIÓN

Bidón 20 l.



DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Momento	Dosis
Alfalfa	Después del corte, cuando haya rebrote	1 - 3 l/ha. Repetir cada 3 cortes
Almendro	Durante brotación y post cosecha previo a la caída de hojas	1 - 5 l/ha
Cítricos	En separación de los botones florales	1 - 5 l/ha
Frutales de carozo	Floración y desarrollo de fruto	1 - 5 l/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad.
Frutales de pepita	Prefloración y floración	1 - 5 l/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Girasol	Desde 4 hojas a prebotón floral	1 - 3 l/ha
Hortícolas	Prefloración-floración y desarrollo de fruto	1 - 5 l/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Maíz	Desde 6 a 10 hojas	1 - 3 l/ha
Maní	Desde prefloración	1 - 3 l/ha
Olivo	Prefloración y floración	1 - 5 l/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Papa	Desde brotación a tuberización	1 - 5 l/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Pistacho	Prefloración y floración	1 - 5 l/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Soja	Inicio de floración (R1) hasta plena floración (R3)	1 - 3 l/ha
Trigo	Z4.0 a Z6.5 junto al fungicida	1 - 3 l/ha
Vid	Prefloración y floración	1 - 5 l/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad

Se recomienda realizar un análisis de suelo previo para ajustar la dosis a aplicar y cubrir los requerimientos del cultivo.

Para más información, consultar con el técnico de Amauta Agro en la zona.